

|                        |                       |   |
|------------------------|-----------------------|---|
| 2 باك علوم رياضية      | تجريبى مادة الرياضيات | الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين    |
| المعامل : 09           | دورة ماي 2011/2010    | جهة الرباط سلازمورزعين - نيابة الخميسات |
| مدة الإنجاز : 04 ساعات |                       | منارة الفردوس                           |

## ■ التمرين رقم 01: (04pts)

في كل ما يلي المستوى العقدي (P) منسوب إلى معلم متعامد و ممنظم  $(O, \vec{u}, \vec{v})$ .  
و الأجزاء الأول و الثاني غير مرتبطين فيما بينهما .

⇐ الجزء الأول: (02pts)

نعتبر في المجموعة  $\mathbb{C}$  المعادلة :

$$z^2 - 2iz - (1 + e^{2i\theta}) = 0, \text{ حيث } \theta \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$$

1- ليكن  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  ، بين أن :

$$e^{ix} - e^{iy} = 2i \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) e^{i\left(\frac{x+y}{2}\right)} \text{ و } e^{ix} + e^{iy} = 2 \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) e^{i\left(\frac{x+y}{2}\right)}$$

2- حل في  $\mathbb{C}$  المعادلة  $(E_\theta)$  ، ثم أكتب الحلين  $z_1$  و  $z_2$  على شكلهما الأسى .

3- لتكن  $A$  و  $B$  النقطتين اللتين لحقاهما على التوالي  $z_1$  و  $z_2$  .

أ- بين أن النقط  $O$  و  $A$  و  $B$  غير مستقيمة و أن المثلث  $OAB$  قائم الزاوية .

ب- ما هي قيمة البارامتر الحقيقي  $\theta$  التي من أجلها يكون المثلث  $OAB$  متساوي الساقين ؟

⇐ الجزء الثاني: (02pts)

نعتبر النقطتين  $A$  و  $B$  اللتين لحقاهما على التوالي  $a$  و  $b+i$  حيث  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  .

و ليكن  $r$  الدوران الذي مركزه  $A$  و زاويته  $\frac{\pi}{3}$  و النقطة  $B'$  هي صورة  $B$  بالدوران  $r$  .

1- أعط الكتابة العقدية للدوران  $r$  ، ثم أحسب  $\text{aff}(B')$  بدلالة  $a$  و  $b$  .

2- بين أن :  $B' \in (Oy) \Leftrightarrow a+b = \sqrt{3}$  ، ثم عبر في هذه الحالة عن  $\text{aff}(B')$  بدلالة  $a$  .

3- نفترض فيما يلي أن :  $a = \sqrt{3}$  و  $b = 0$  .

و لتكن  $C$  و  $D$  النقطتين اللتين لحقاهما على التوالي :  $c = -i$  و  $d = 2 + \sqrt{3}(1-2i)$  .

أ- ما هي طبيعة المثلث  $ABC$  ؟ أحسب  $\frac{d-a}{c-a}$  واستنتج طبيعة المثلث  $ACD$  .

ب- نضع :  $E = r(D)$  و لتكن  $F$  صورة  $D$  بالازاحة ذات المتجهة  $\overrightarrow{AC}$  .

⇐ أحسب حقي النقطتين  $E$  و  $F$  ، ثم أثبت أن المثلث  $BEF$  متساوي الأضلاع .

■ التمرين رقم 02: (02pts)

في المجموعة  $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$  نعرف قانون التركيب الداخلي  $*$  كما يلي :

تكن  $(a,b)$  و  $(c,d)$  من  $G$  :  $(a,b) * (c,d) = (ac, ad + b)$  .

1- بين أن  $(G, *)$  زمرة غير تبادلية .

2- نضع :  $H = \mathbb{R}^{*+} \times \mathbb{R}$  ، بين أن  $H$  زمرة جزئية من  $(G, *)$  .

3- لكل  $(a,b) \in G$  ، نعتبر التطبيق  $f_{(a,b)}$  المعرف من  $\mathbb{R}$  نحو  $\mathbb{R}$  بما يلي :

$$E = \{ f_{(a,b)} / (a,b) \in G \} , \text{ و نعتبر المجموعة : } (\forall x \in \mathbb{R}); f_{(a,b)}(x) = ax + b$$

و ليكن  $h$  التطبيق المعرف من  $G$  نحو  $E$  بما يلي :  $(\forall (a,b) \in G); h((a,b)) = f_{(a,b)}$  .

⇐ بين أن  $h$  تشاكل تقابلي من  $(G, *)$  نحو  $(E, \circ)$  ، ثم إستنتج بنية  $(E, \circ)$  وحدد مماثل كل عنصر  $f_{(a,b)}$  من  $E$  بالنسبة للقانون  $\circ$  .

■ التمرين رقم 03: (04pts)

الجزءان الأول والثاني غير مرتبطين فيما بينهما .

⇐ الجزء الأول: (1,25pts)

1- حدد عددا صحيحا طبيعيا غير منعدم  $n_0$  يحقق :  $(2^3)^{n_0} \equiv 1[17]$  و  $(5^2)^{n_0} \equiv 1[17]$  .

2- بين أن :  $(\forall n \in \mathbb{N}^*); 5^{32n+1} - 2^{48n+2} \equiv 1[17]$  .

⇐ الجزء الثاني: (2,75pts)

1- نعتبر في المجموعة  $\mathbb{Z}$  المعادلة :  $(E): ax \equiv 1[p]$  .

حيث  $a$  عنصر من  $A_p = \{1; 2; 3; \dots; p-1\}$  و  $p \geq 3$  عدد أولي .

أ- بين أن العدد  $a^{p-2}$  حل للمعادلة  $(E)$  .

ب- ليكن  $r$  باقي القسمة الأقليدية ل  $a^{p-2}$  على  $p$  ، بين أن  $r \in A_p$  و أن  $r$  هو الحل الوحيد

للمعادلة  $(E)$  في المجموعة  $A_p$  .

2- نأخذ فيما يلي من التمرين  $p = 31$  .

أ- حدد قيمة  $r$  من أجل  $a = 2$  و  $a = 3$  .

ب- حل في المجموعة  $\mathbb{Z}$  كل معادلة مما يلي :  $(F_1): 2x \equiv 1[31]$  و  $(F_2): 3x \equiv 1[31]$  .

ج- إستنتج مجموعة حلول المعادلة :  $(F): 6x^2 - 5x + 1 \equiv 0[31]$  في المجموعة  $\mathbb{Z}$  .

■ التمرين رقم 04: (10pts)

↔ الجزء الأول: (02pts)

تكن  $h$  الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بما يلي :

$$(\forall t \in \mathbb{R}); h(t) = e^t - (t+1)$$

$$(1) - \text{بين أن : } e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \int_0^x h(t) dt \text{ ; } (\forall x \in \mathbb{R})$$

(2) - حداد منحنى تغيرات الدالة  $h$  على كل من المجالين  $[0; +\infty[$  و  $]-\infty; 0]$  .

$$(3) - \text{ليكن } x \in \mathbb{R}^+ \text{ ، بين أن : } 0 \leq \int_0^x h(t) dt \leq xh(x) \text{ و } \frac{1}{2} \leq \frac{e^x - (x+1)}{x^2} \leq \frac{1}{2} + \frac{h(x)}{x}$$

$$(4) - \text{ليكن } x \in \mathbb{R}^- \text{ ، بين أن : } xh(x) \leq \int_0^x h(t) dt \leq 0 \text{ و } \frac{1}{2} + \frac{h(x)}{x} \leq \frac{e^x - (x+1)}{x^2} \leq \frac{1}{2}$$

$$(5) - \text{أحسب : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x)}{x} \text{ ، ثم إستنتج النهاية : } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (x+1)}{x^2}$$

↔ الجزء الثاني: (03pts)

تكن  $f$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R}$  بما يلي :

$$(\forall x \in \mathbb{R}^*); f(x) = \frac{x}{e^x - 1} \text{ و } f(0) = 1$$

(1) - بين أن الدالة  $f$  متصلة على  $\mathbb{R}$  .

(2) - أدرس الفرعين اللانهائيين للمنحنى  $(C_f)$  بجوار  $+\infty$  و  $-\infty$  .

(3) - بين أن  $f$  قابلة للإشتقاق في الصفر ( إستعمل نتيجة الجزء الأول (5) ) .

$$(4) - \text{بين أن : } f'(x) = \frac{\varphi(x)}{(e^x - 1)^2} \text{ ; } (\forall x \in \mathbb{R}^*) \text{ ، حيث } \varphi(x) = (1-x)e^x - 1$$

(5) - أدرس تغيرات  $\varphi$  على  $\mathbb{R}$  وإستنتج إشارتها على  $\mathbb{R}^*$  .

(6) - ضع جدول تغيرات الدالة  $f$  .

(7) - أرسم المنحنى  $(C_f)$  في المعلم  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  مبرزاً المماس في النقطة ذات الأفصول  $x_0 = 0$  .

← الجزء الثالث: (02pts)

تتكن  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  المتتالية المعرفة بما يلي :

$$. (\forall n \in \mathbb{N}); u_{n+1} = f(u_n) \text{ و } u_0 = 1$$

(1)- بين أن المعادلة :  $f(x) = x$  (E) تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  في  $\mathbb{R}$  ينبغي تحديده .

$$(2)- أ- بين أن :  $(\forall x \in ]0; +\infty[); f'(x) + \frac{1}{2} = \frac{e^{2x} - 2xe^x - 1}{2(e^x - 1)^2}$$$

ب- بين أن نكل  $x \in \mathbb{R}^+$  :  $e^{2x} - 2xe^x - 1 \geq 0$  ، ثم إستنتج أن :  $-\frac{1}{2} \leq f'(x) < 0$

$$(3)- أ- بين أن :  $(\forall n \in \mathbb{N}); |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$$$

ب- إستنتج أن :  $(\forall n \in \mathbb{N}); |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2^n}(1 - \alpha)$  ، ثم أحسب نهاية  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$

← الجزء الرابع: (03pts)

تتكن الدالة F المعرفة على  $\mathbb{R}$  بما يلي :  $F(x) = \int_x^{2x} f(t) dt$

(1)- بين أن :  $(\forall x \in [0; +\infty[); 0 \leq F(x) \leq xf(x)$  ، ثم إستنتج :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$

(2)- بين أن :  $(\forall x \in ]-\infty; 0]); F(x) \leq xf(x)$  ، ثم إستنتج :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{F(x)}{x}$

(3)- بين أن F قابلة للإشتقاق على  $\mathbb{R}$  و أن :

$$. (\forall x \in \mathbb{R}^*); F'(x) = \frac{x(3 - e^x)}{e^{2x} - 1} \text{ و } F'(0) = 1$$

(4)- ضع جدول تغيرات الدالة F ، ثم أرسم المنحنى  $(C_F)$  في معلم متعامد و ممنظم .

(نعطي :  $\ln 3 \approx 1,1$  و  $F(\ln 3) \approx 0,44$  )

■ التمرين الإضافي: (02pts plus)

تتكن f الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}$  بما يلي :  $f(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

(1)- بين أن :  $(\forall x \in [0; 1]); 1 + \frac{x^2}{2} \leq f(x) \leq 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12}$

(2)- أحسب نهاية المتتالية  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  المعرفة بما يلي :  $u_n = \left( \sum_{k=1}^n f\left(\frac{1}{\sqrt{n+k}}\right) \right) - n$