



الصفحة  
1  
3

# الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

الدورة الإستدراكية 2012

7	المعامل	NS22	الرياضيات	المادة
3	مدة الأنجاز	شعبة العلوم التجريبية بمسالكها وشعبة العلوم والتكنولوجيات بمسلكيها	الشعب(ة) أو السلك	

[www.9alami.com](http://www.9alami.com)

## معلومات عامة

- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير قابلة للبرمجة ،
- مدة إنجاز موضوع الامتحان : 3 ساعات ،
- عدد الصفحات: 3 صفحات (الصفحة الأولى تتضمن معلومات والصفحتان المتبقيتان تتضمنان تمارين الامتحان) ،
- يمكن للمترشح إنجاز تمارين الامتحان حسب الترتيب الذي يناسبه ،
- ينبغي تفادي استعمال اللون الأحمر عند تحرير الأجوبة ،
- بالرغم من تكرار بعض الرموز في أكثر من تمارين ، فكل رمز مرتبط بالتمرين المستعمل فيه ولا علاقة له بالتمارين السابقة أو اللاحقة .

## معلومات خاصة

يتكون الموضوع من خمسة تمارين مستقلة فيما بينها وتتوزع حسب المجالات كما يلي :

النقطة المنوحة	المجال	التمرين
3 ن	الهندسة الفضائية	التمرين الأول
3 ن	الأعداد العقدية	التمرين الثاني
3 ن	المتاليات العددية	التمرين الثالث
3 ن	حساب الاحتمالات	التمرين الرابع
8 ن	دراسة دالة وحساب تكامل	التمرين الخامس

بالنسبة للتمرين الخامس،  $\ln$  يرمز لدالة اللوغاريتم النبيري.

## الموضوع

### التمرين الأول : (3 ن)

نعتبر ، في الفضاء المنسوب إلى معلم متعمد مباشر  $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  ، النقط  $B(0,0,-3,0,0)$  و  $A(-3,0,0)$  و  $C(0,2,-2)$  والفلكة  $(S)$  التي مركزها  $\Omega(1,1,1)$  وشعاعها هو

1) أ- بين أن  $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 6\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$  ثم استنتج أن  $2x - y + 2z + 6 = 0$  هي معادلة ديكارتية للمستوى  $(ABC)$  1.25

ب- احسب المسافة  $d(\Omega, (ABC))$  واستنتج أن المستوى  $(ABC)$  مماس للفلكة  $(S)$  0.75

2) ليكن  $(D)$  المستقيم المار من  $\Omega$  والعمودي على المستوى  $(ABC)$  2

$$\text{أ- بين أن : } \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad (t \in IR) \quad 0.5$$

تمثيل باراميترى للمستقيم  $(D)$ .

ب- بين أن مثلث إحداثيات  $H$  نقطة تمسك المستوى  $(ABC)$  والفلكة  $(S)$  هو  $(-1, 2, -1)$  0.5

### التمرين الثاني : (3 ن)

نعتبر ، في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعمد منظم مباشر  $(O, \vec{u}, \vec{v})$  ، النقط  $A$  و  $B$  و  $C$  التي أحاقها على التوالي هي  $a$  و  $b$  و  $c$  بحيث :  $a = 2 - i$  و  $b = 6 - 7i$  و  $c = 8 + 3i$

$$\text{أ- بين أن : } \frac{c-a}{b-a} = i \quad (1) \quad 0.75$$

ب- استنتاج أن المثلث  $ABC$  متساوي الساقين وقائم الزاوية في  $A$  . 0.75

2) ليكن  $z$  لحق نقطة  $M$  من المستوى و  $'z$  لحق النقطة  $M$  صورة بالدوران  $R$  الذي مركزه النقطة  $\Omega$  2

$$\text{أ- تحقق من أن لحق القطعة } [BC] \text{ وزاويته } -\frac{\pi}{2} \quad 0.5$$

$$\omega = 7 - 2i \quad \text{ب- تتحقق من أن لحق النقطة } \Omega \text{ هو } z = -iz + 9 + 5i \quad 0.75$$

ج- بين أن النقطة  $C$  هي صورة النقطة  $A$  بالدوران  $R$  0.25

### التمرين الثالث : (3 ن)

نعتبر المتالية العددية  $(u_n)$  المعرفة بما يلي :  $u_0 = 3$  و  $u_{n+1} = \frac{4u_n + 3}{3u_n + 4}$  لكل  $n$  من  $IN$  .

1) بين بالترجع أن :  $u_n > 1$  لكل  $n$  من  $IN$  0.5

$$\text{نضع : } v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1} \quad (2) \quad 0.5$$

أ- تتحقق من أن :  $1 - v_n < 1$  لكل  $n$  من  $IN$  واستنتاج أن  $1 - v_n > 0$  لكل  $n$  من  $IN$  0.5

$$\text{ب- بين أن : } u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n} \quad 0.5$$

أ- بين أن  $(v_n)$  متالية هندسية أساسها  $\frac{1}{7}$  و أكتب  $(v_n)$  بدالة  $n$  . (3) 1

ب- بين أن :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$  ثم استنتاج نهاية المتالية  $(u_n)$  . 0.5

## التمرين الرابع : (3 ن)

يحتوي صندوق على خمس كرات حمراء وأربع كرات بيضاء وثلاث كرات خضراء ( نعتبر أنه لا يمكن التمييز بين الكرات باللمس )  
 نسحب عشوائيا وفي آن واحد ثلاثة كرات من الصندوق .

(1) بين أن احتمال الحصول على ثلاثة كرات حمراء هو  $\frac{1}{22}$  1

(2) بين أن احتمال الحصول على ثلاثة كرات من نفس اللون هو  $\frac{3}{44}$  1

(3) بين أن احتمال الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل هو  $\frac{37}{44}$  1

## التمرين الخامس : (8 ن)

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $IR$  بمالي :

و  $(C)$  المنحنى الممثل للدالة في معلم متعمد منظم  $(\vec{O}, \vec{i}, \vec{j})$

(1) بين أن  $f(-x) = -f(x)$  لكل  $x$  من  $IR$  واستنتج أن النقطة  $O$  مركز تماثل للمنحنى (C) 0.75

(2) تحقق من أن :  $f(x) = x + 1 - \frac{2}{e^x + 1}$  لكل  $x$  من  $IR$  0.5

(يستحسن استعمال هذه الصيغة لـ  $f(x)$  لمعالجة الأسئلة الموالية )

(3) أ- بين أن :  $f'(0) = \frac{3}{2}$   $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2}$  لكل  $x$  من  $IR$  وتحقق من أن : 1.25

ب- بين أن الدالة  $f$  تزايدية على  $IR$

ج- بين أن  $y = \frac{3}{2}x$  هي معادلة ديكارتية لل المستقيم ( $T$ ) مماس المنحنى (C) في النقطة  $O$  0.5

(4) أ- بين أن :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  0.5

ب- أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)]$  واستنتج أن المستقيم (D) الذي معادلته  $y = x+1$  مقارب للمنحنى (C) بجوار  $+\infty$  0.5

ج- بين أن المنحنى (C) يوجد تحت المستقيم (D)

(5) أنشئ المستقيمين (D) و (T) والمنحنى (C) (ذكر أن  $O$  هو مركز تماثل للمنحنى (C)) 1.5

(6) أ- بين أن الدالة  $H : x \mapsto x - \ln(e^x + 1)$  دالة أصلية للدالة  $I$  على  $IR$  0.75

ب- استنتاج أن :  $\int_0^{\ln 2} \frac{1}{e^x + 1} dx = \ln 4 - \ln 3$  0.5

ج- احسب مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى (C) و المستقيم (D) والمستقيمين اللذين معادلتاهما  $x=0$  و  $x=\ln 2$  0.5