

مباراة الدخول الى مسالك التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم
مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى
دورة 15 - 16 يوليوز 2018

اختبار في المعارف المرتبطة بمواد التعليم الثانوي التأهيلي
التخصص: الرياضيات

المعامل 3

مدة الإنجاز 3 ساعات

✓ يؤخذ بعين الاعتبار في التنقيط تنظيم الورقة ووضوح البرهان؛

✓ إذا لاحظ المترشح ما قد يظهر له خطأ فليشر إليه في ورقته ويتابع انجاز الموضوع.

الموضوع:

نعتبر المعادلة التالية:

$$(E): \quad x^2 + y^2 - z^2 = 0, \quad (x, y, z) \in (\mathbb{N}^*)^3$$

نرمز ب S لمجموعة حلول المعادلة (E) وب T لمجموعة العناصر $(x, y, z) \in S$ بحيث الأعداد x, y, z تكون أولية فيما بينها في مجموعها.

الجزء الأول

(1) ليكن ABC مثلثا قائم الزاوية في A .

(أ) لنفترض أن $AB = 1$ و $AC = \sqrt{n}$ مع n عدد صحيح طبيعي غير

منعدم. أوجد المسافة BC .

(ب) إستنتج طريقة إنشاء قطعة طولها $\sqrt{3}$ باستعمال مسطرة غير

مدرجة و بركار، إنطلاقا من قطعة طولها 1.

(2) (أ) بيّن أنه لا يوجد أي مثلث قائم الزاوية أطوال أضلاعه أعداد صحيحة

طبيعية أحدها يساوي 1.

(ب) بيّن أنه لا يوجد أي مثلث قائم الزاوية و متساوي الساقين أضلاعه

أعداد صحيحة طبيعية.

(3) (أ) أوجد كل المثلثات قائمة الزاوية التي أطوال أضلاعها أعداد صحيحة طبيعية متتالية.

(ب) ليكن $(a, b, c) \in (\mathbb{N}^*)^3$ حلاً للمعادلة (E) بحيث $a < b < c$ و a, b, c هي حدود متتالية حسابية. بين أن الأعداد a, b, c متناسبة في هذا الترتيب مع الأعداد 3, 4, 5.

الجزء الثاني

ليكن (x, y, z) حلاً للمعادلة (E) و $k \in \mathbb{N}^*$.

(1) بين أن (kx, ky, kz) حل للمعادلة (E) واستنتج أن المجموعة S غير منتهية.

(2) نعتبر $(k, n) \in (\mathbb{N}^*)^2$. بين التكافؤ

k يقسم n تكافؤ k^2 يقسم n^2

(3) نعتبر الآن (x, y, z) عنصراً من T بين أن الأعداد x, y, z أولية فيما بينها مثنى مثنى.

(4) بين أنه مهما يكن (x, y, z) عنصراً من S فإنه يوجد (u, v, w) عنصر وحيد من T و k عدد صحيح طبيعي غير منعدم وحيد بحيث :

$$(x, y, z) = (ku, kv, kw)$$

(5) ليكن $(u, v, w) \in T$

(أ) بين أنه من بين الأعداد u و v و w واحد وواحد فقط هو عدد زوجي.

(ب) بين أن w عدد فردي.

(ج) استنتج أنه لكل (x, y, z) من S لدينا $x \neq y$.

(6) ليكن $(u, v, w) \in T$. نفترض أن u فردي.

(أ) نضع $r = \frac{v}{2}, s = \frac{u+w}{2}, t = \frac{w-u}{2}$

بين أن s و t عددان صحيحان طبيعيان غير منعدمين و أوليان فيما بينهما.

(ب) ليكن m و n عددين صحيحين طبيعيين غير منعدمين وأولييين فيما بينهما بحيث :

$$\frac{r}{t} = \frac{m}{n}$$

بين أن $(u, v, w) = (m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$ ، وأن $n < m$ و n ليست لهما نفس الزوجية.

(ج) استنتج الخاصية المميزة لعناصر المجموعة T الآتية:

$(u, v, w) \in T$ و u عدد فردي إذا وفقط إذا وجد m و n عددان صحيحان طبيعيين غير منعدمين، أوليان فيما بينهما وليست لهما نفس الزوجية بحيث $n < m$ و $(u, v, w) = (m^2 - n^2, 2mn, m^2 + n^2)$.

الزوج (m, n) يسمى مولدا للعنصر (u, v, w)

(7أ) ليكن p عددا أوليا بحيث $p \equiv 1 [4]$. نقبل أنه يوجد عددان صحيحان طبيعيين m و n بحيث $p = m^2 + n^2$. بين أنه يوجد مثلث قائم الزاوية طول وتره يساوي p . واستنتج أن مجموعة المثلثات قائمة الزاوية التي وترها عدد أولي هي مجموعة غير منتهية.

(ب) ليكن p عددا أوليا فرديا.

بين أن الزوج $(\frac{p+1}{2}, \frac{p-1}{2})$ مولد لعنصر من T .

واستنتج انه يوجد ما لا نهاية من المثلثات قائمة الزاوية أطوال أضلاعها أعداد صحيحة طبيعية بحيث أحد ضلعي الزاوية القائمة هو عدد أولي فردي.



ج) هل يوجد مثلث قائم الزاوية أطوال أضلاعه أعداد صحيحة طبيعية
أحدها يساوي 2؟ علل جوابك.

8) ليكن u و w عددين أوليين فرديين .

بين التكافؤ التالي:

$$(u, v, w) \in T \Leftrightarrow \text{يوجد } v \in \mathbb{N}^* \text{ بحيث } u^2 = 2w - 1$$

الجزء الثالث

المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم (O, \vec{i}, \vec{j}) ، لتكن \mathcal{C} الدائرة التي
مركزها O وشعاعها 1 و A و B النقطتين اللتين إحداثيتهما على التوالي
هي $(1, 0)$ و $(-1, 0)$. ليكن (D) المستقيم الذي معادلته: $x = -1$

1) ليكن $t \in \mathbb{R}$ و M_t النقطة من المستوى بحيث: $\overrightarrow{BM_t} = t\vec{j}$. إعطِ إحداثيتي H_t

2) إعطِ معادلتا ديكارتية للمستقيم (AM_t) بدلالة t .

3) المستقيم (AM_t) يقطع الدائرة \mathcal{C} في النقطتين A و N_t .

اعطِ إحداثيتي النقطة N_t في المعلم (O, \vec{i}, \vec{j}) بدلالة t .

4) لتكن $P(u, v)$ نقطة من الدائرة \mathcal{C} بحيث $P \neq A$

أ) المستقيمان (AP) و (D) يتقاطعان في النقطة Q . إعطِ إحداثيتي Q .

$$P = N \frac{2v}{1-u}$$

5) استنتج أنه مهما يكن $s > 0$ و $r > 0$ عددين جديين بحيث:

$$s^2 + r^2 = 1$$

فإنه يوجد عدد جدي وحيد t أكبر قطعا من 2

$$\begin{cases} r = \frac{t^2 - 4}{t^2 + 4} \\ s = \frac{4t}{t^2 + 4} \end{cases} \quad \text{بحيث}$$

6) ليكن (x, y, z) عناصر من S بحيث $x < y$.

أ) بين أنه يوجد عدد جذري وحيد t بحيث: $2 < t < 2\sqrt{2} + 2$ و

$$\begin{cases} \frac{x}{z} = \frac{t^2 - 4}{t^2 + 4} \\ \frac{y}{z} = \frac{4t}{t^2 + 4} \end{cases}$$

ب) استنتج أنه يوجد عدداً صحيحان طبيعيان غير منعدمين و أوليان فيما بينهما p و q بحيث: $2q < p < (2\sqrt{2} + 2)q$

و

$$\frac{x}{z} = \frac{p^2 - 4q^2}{p^2 + 4q^2} ; \quad \frac{y}{z} = \frac{4pq}{p^2 + 4q^2}$$

ج) هل $(p^2 - 4q^2, 4pq, p^2 + 4q^2)$ ينتمي إلى T ؟ علل جوابك.

7) إعط عنصرين مختلفين من T واعط لكل منهما زوجاً مولداً.